

【子宮頸癌】

【術後補助】

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|---------------------------------|--------|-----|-------------------|------|---------------------|---------|
| Short Hydration 低用量CDDP+Radi | シスプラチン | 40 | mg/m ² | 静注 | 1 | 7 |
| NDP+Radi | ネダプラチン | 30 | mg/m ² | 静注 | 1,8,15,22, 29,36 | 42 |

【進行再発】

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|----------------------|----------|-------|-------------------|------|--------|---------|
| NDP+CPT | ネダプラチン | 80 | mg/m ² | 静注 | 1 | 28 |
| | イリノテカン | 60 | mg/m ² | | 1,8,15 | |
| CPT単剤 | イリノテカン | 100 | mg/m ² | 静注 | 1,8,15 | 28 |
| CDDP+CPT | シスプラチン | 60 | mg/m ² | 静注 | 1 | 28 |
| | イリノテカン | 60 | mg/m ² | | 1,8,15 | |
| TC | パクリタキセル | 175 | mg/m ² | 静注 | 1 | 21 |
| | カルボプラチン | AUC=5 | | | 1 | |
| TP+BEV | パクリタキセル | 175 | mg/m ² | 静注 | 1 | 21 |
| | シスプラチン | 50 | mg/m ² | | 1 | |
| | ペバシズマブ | 15 | mg/kg | | 1 | |
| NDP単剤 | ネダプラチン | 80 | mg/m ² | 静注 | 1 | 28 |
| DC | ドセタキセル | 60 | mg/m ² | 静注 | 1 | 21 |
| | カルボプラチン | AUC=6 | | | 1 | |
| NGT+PTX+BEV | ノギテカン | 0.75 | mg/m ² | 静注 | 1-3 | 21 |
| | パクリタキセル | 175 | mg/m ² | | 1 | |
| | ペバシズマブ | 15 | mg/kg | | 1 | |
| TC+Pembrolizumab | パクリタキセル | 175 | mg/m ² | 静注 | 1 | 21 |
| | カルボプラチン | AUC=5 | | | 1 | |
| | ペムブロリズマブ | 200 | mg/body | | 1 | |
| TC+BEV+Pembrolizumab | パクリタキセル | 175 | mg/m ² | 静注 | 1 | 21 |
| | カルボプラチン | AUC=5 | | | 1 | |
| | ペムブロリズマブ | 200 | mg/body | | 1 | |
| | ペバシズマブ | 15 | mg/kg | | 1 | |
| TP+Pembrolizumab | パクリタキセル | 175 | mg/m ² | 静注 | 1 | 21 |
| | シスプラチン | 50 | mg/m ² | | 1 | |
| | ペムブロリズマブ | 200 | mg/body | | 1 | |
| TP+BEV+Pembrolizumab | パクリタキセル | 175 | mg/m ² | 静注 | 1 | 21 |
| | シスプラチン | 50 | mg/m ² | | 1 | |
| | ペムブロリズマブ | 200 | mg/body | | 1 | |
| | ペバシズマブ | 15 | mg/kg | | 1 | |
| Cemiplimab単剤 | セミプリマブ | 350 | mg/body | 静注 | 1 | 21 |
| CDDP+CPT(子宮頸部小細胞癌) | シスプラチン | 60 | mg/m ² | 静注 | 1 | 28 |
| | イリノテカン | 60 | mg/m ² | | 1,8,15 | |