

【頭頸部癌】

【進行再発】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール(日)	
CDDP+Radi	シスプラチン	100	mg/m ²	静注	1,22,43	63	
アービタックス+Radi	セツキシマブ(初回)	400	mg/m ²	静注	1,8,15,22, 29,36,43	50	
	セツキシマブ(2回目以降)	250	mg/m ²				
アービタックス+FP	セツキシマブ(初回)	400	mg/m ²	静注	1,8,15,22	28	
	セツキシマブ(2回目以降)	250	mg/m ²				
	フルオロウラシル	800	mg/m ²				1-5
	シスプラチン	60	mg/m ²				1
アービタックス+FP (7クール目以降)	セツキシマブ	250	mg/m ²	静注	1,8,15,22	28	
アービタックス+CBDCA+5-FU	セツキシマブ(初回)	400	mg/m ²	静注	1,8,15,22	28	
	セツキシマブ(2回目以降)	250	mg/m ²				
	フルオロウラシル	800	mg/m ²				1-5
	カルボプラチン	AUC=5					1
アービタックス+CBDCA+5-FU (7クール目以降)	セツキシマブ	250	mg/m ²	静注	1,8,15,22	28	
セツキシマブ+パクリタキセル	セツキシマブ(初回)	400	mg/m ²	静注	1	7	
	セツキシマブ(2回目以降)	250	mg/m ²		1		
	パクリタキセル	80	mg/m ²		1		
Pembrolizumab単剤	ペムブロリズマブ	200	mg/body	静注	1	21	
Nivolumab単剤	ニボルマブ	240	mg/body	静注	1	14	
Triweekly Trastuzumab+DTX	トラスツズマブ(初回)	8	mg/kg	静注	1	21	
	トラスツズマブ(2回目以降)	6	mg/kg		1		
	ドセタキセル	70	mg/m ²		1		
FP+Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200	mg/body	静注	1	21	
	フルオロウラシル	1000	mg/m ²		1-4		
	シスプラチン	100	mg/m ²		1		
FP+Pembrolizumab (7クール目以降)	ペムブロリズマブ	200	mg/body	静注	1	21	

【術後補助】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール(日)
Short hydration Weekly CDDP+Radi	シスプラチン	40	mg/m ²	静注	1,8,15,22, 29,36,43	49