

【腫瘍】

【術前】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール(日)
GEM+S-1	S-1	80	mg/m ²	内服	1-14	21
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	静注	1,8	

【術後】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール(日)
GEM単剤	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	静注	1,8,15	28

【進行再発】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール(日)
GEM単剤	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	静注	1,8,15	28
GEM+S-1	S-1	60	mg/m ²	内服	1-14	21
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	静注	1,8	
nab-PTX+GEM	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	125	mg/m ²	静注	1,8,15	28
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²		1,8,15	
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85	mg/m ²	静注	1	14
	レボホリナート	200	mg/m ²		1	
	イリノテカン	180	mg/m ²		1	
	フルオロウラシル(急速)	400	mg/m ²		1	
	フルオロウラシル(持続)	2400	mg/m ²		1	
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	85	mg/m ²	静注	1	14
	レボホリナート	200	mg/m ²		1	
	イリノテカン	150	mg/m ²		1	
	フルオロウラシル(持続)	2400	mg/m ²		1	
nal-IRI+5-FU+l-LV	ナリボソーム型イリノテカン	70	mg/m ²	静注	1	14
	レボホリナート	200	mg/m ²		1	
	フルオロウラシル(持続)	2400	mg/m ²		1	