

【尿路上皮癌】

【術前】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール (日)
Split-dose GC	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	静注	1,8	21
	シスプラチン	35	mg/m ²		1,8	

【術後】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール (日)
GCarbo	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	静注	1,8	21
	カルボプラチン	AUC=4.5			1	
Nivolumab単剤	ニボルマブ	240	mg/body	静注	1	14

【進行再発】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール (日)
Short GC	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	静注	1,8	21
	シスプラチン	70	mg/m ²		2	
GN	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	静注	1,8	21
	ネダプラチン	80	mg/m ²		1	
GP	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	静注	1,8,15	28
	パクリタキセル	180	mg/m ²		1	
GCarbo	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	静注	1,8	21
	カルボプラチン	AUC=4.5			1	
Pembrolizumab単剤	ペムブロリズマブ	200	mg/body	静注	1	21
Avelumab単剤 (維持)	アベルマブ	10	mg/kg	静注	1	14
Enfortumab Vedotin単剤	エンホルツマブ ベドチン	1.25	mg/kg	静注	1,8,15	28